

PREPARACIÓN

- No aplica

REQUISITOS

- Asistir a cita con resultados de prueba de embarazo no mayor a 2 días. (Aplica para Inserción)
- Presentarse en el área de facturación con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita, con orden médica y autorización vigente del procedimiento.

RECOMENDACIONES POS PROCEDIMIENTO

- Se recomienda el uso de métodos de barrera durante el primer mes post inserción del implante subdérmico.
- El sitio de inserción debe permanecer limpio y seco y debe conservar el vendaje de compresión hasta la cita de control a las 72 horas.
- Después de que haya pasado el efecto anestésico, puede presentar sensibilidad en el brazo durante algunos días.
- Puede presentar inflamación en el sitio de inserción. Esto es común y desaparecerá sin tratamiento.
- No practicar ejercicios con los brazos que conlleven fuerza durante los primeros 7 días.
- No retirar el vendaje hasta el control (primeras 72 horas).
- No mojar el vendaje (cubrir con plástico antes del baño diario).
- No tocar ni presionar el sitio de inserción hasta que cicatrice.
- En caso de dolor, calor, rubor intenso solicitar cita médica prioritaria.
- Tiempo de duración del método (3, 4 o 5 años).
- Una vez retirado el implante es importante tener claro que es posible quedar en embarazo, en caso de que no lo desee es necesario asistir a una consulta de planificación familiar para escoger otro método.
- En caso de que ya tenga otro método seleccionado es necesario seguir las recomendaciones dadas en la asesoría de planificación familiar en inicio y continuidad del método.
- En caso de deseo de embarazo, es necesario que asista a consulta Preconcepcional para identificación de factores de riesgo e intervención oportuna para que el embarazo sea controlado y sano.

CONTROLES: Regresar a control para el retiro del vendaje a las 72 horas – al mes – a los 6 meses y al año.

POSIBLES COMPLICACIONES

Locales:

- Dolor, hematoma o inflamación
- Infección en el sitio de inserción/retiro
- Sangrado leve
- Cicatriz

Del procedimiento (Inserción de implante)

- Inserción profunda o incorrecta
- Dificultad en el retiro
- Migración del implante (raro)

Sistémicas (relacionadas al método):

- Alteraciones del sangrado menstrual

- Cefalea
- Aumento o disminución de peso
- Cambios en el estado de ánimo

Del procedimiento (Retiro de implante)

- Dificultad para localizar o extraer el implante
- Retiro incompleto (fragmentación del implante)
- Inserción profunda previa que dificulta el retiro
- Lesión de tejidos cercanos

Neurológicas o vasculares (poco frecuentes):

- Lesión de nervios (hormigueo, entumecimiento, dolor persistente)
- Lesión de vasos sanguíneos

Otras:

- Reacción al anestésico local
- Ansiedad o reacción vasovagal (mareo, desmayo)

SIGNOS Y SÍNTOMAS PARA ACUDIR A URGENCIAS

- Fiebre (mayor a 38 °C).
- Dolor intenso o que aumenta en la zona del procedimiento.
- Enrojecimiento, calor o inflamación excesiva en el sitio.
- Salida de pus o mal olor en la herida.
- Sangrado abundante o que no cede.
- Entumecimiento, hormigueo o pérdida de movilidad en el brazo.
- No se palpa el implante (en caso de inserción).
- Hematoma grande o en aumento.
- Apertura de la herida.
- Sospecha de embarazo.
- Sangrado vaginal abundante o prolongado.
- Dolor de cabeza intenso o persistente.
- Alteraciones visuales o dolor en el pecho (poco frecuente, pero importante)