

PREPARACIÓN

- No estar menstruando (ideal tomar la muestra fuera del periodo menstrual).
- No haber tenido relaciones sexuales en las últimas 72 horas.
- No utilice duchas vaginales, óvulos, cremas o espermicidas en las últimas 72 horas.
- Vaciar la vejiga antes del procedimiento.
- Tener adecuada higiene íntima externa (sin uso de productos intravaginales).
- Asistir con ropa cómoda (NO fajas, medias veladas etc.)

Nota: Para la prueba de ADN para VPH: todas las anteriores y si le han realizado algún procedimiento, como citología, cauterizaciones, conización, entre otros, debe esperar 2 meses para la realización del procedimiento.

REQUISITOS

- Solicitar cita para la Toma De Citología Cervicouterina y/o ADN VPH.
- Presentarse en el área de facturación con 30 minutos de anticipación a la hora de la cita, con orden médica y autorización vigente del procedimiento.
- Los pacientes menores de edad deben presentarse con acudiente (madre, padre o acudiente legal)
- Los pacientes con trastorno neurológico, embarazadas y adultos mayores, deben presentarse con acompañante adulto responsable.

RECOMENDACIONES POST PROCEDIMIENTO

- Puede presentar leve sangrado o manchado (normal).
- Evitar relaciones sexuales el mismo día del procedimiento.
- No usar tampones ni duchas vaginales durante 24 horas.
- Puede continuar actividades normales inmediatamente.

SIGNOS DE ALARMA (CONSULTAR):

- Sangrado abundante.
- Dolor pélvico intenso.
- Fiebre.
- Flujo con mal olor o color anormal.

CONTROLES: Los resultados serán enviados por correo electrónico (generalmente entre 10 –15 días).

Citología: La tamización a mujeres de 25 a 29 años en esquema 1 – 3 - 3 (cada 3 años) ante resultados negativos.

Pruebas de ADN/VPH: La tamización a mujeres entre 30 y 65 años, con un esquema 1-5-5 (cada 5 años) ante resultados negativos.

*Mujeres con factores de riesgo o antecedentes de cáncer personales o familiares deben asistir a su médico tratante periódicamente.

POSIBLES COMPLICACIONES

- Sangrado leve (más frecuente).
- Molestia o dolor leve durante la toma.
- Infección vaginal (raro).
- Flujo vaginal leve posterior.
- Ansiedad o incomodidad emocional.